

برداشتن آپاندیس با عمل جراحی



قبل از عمل

بعد از عمل

آپاندکتومی

ی

کد: ED-PM-003-01	
تاریخ انتشار	93/10/20
تاریخ بازنگری	94/10/20
منابع	برگرفته از کتاب داخلی جراحی برونر-سودارث
تایید پزشکان	آقای دکتر شاهزادگان

برای اطلاعات بیشتر به انجمن حمایت از بیماران
دیابتی واقع در خیابان نادری روبروی داروخانه رازی
مراجعه نمایید. تلفن تماس: 33321711



قزوین ، خیابان فردوسی ، بالاتر از
چهارراه فردوسی ، جنب مرکز دیالیز
تلفن: 70-333365160
وب سایت: www.mehreganhospital.ir
پست الکترونیکی:
mehreganhospital@IRAN.IR

توصیه به بیمار بعد از ترخیص:

پانسمان ناحیه عمل قبل از
ترخیص از بیمارستان تعویض شده
و ناحیه عمل توسط پزشک و
پرستار کنترل می شود.
- در منزل تا 48 ساعت حمام
نرفته سپس پانسمان ناحیه عمل
را برداشته و به حمام بروید. از
این پس ناحیه عمل نیاز به
پانسمان ندارد مگر اینکه پزشک
معال شما دستور داده باشد. یک
هفته بعد از عمل جراحی برای
کشیدن بخیه های ناحیه عمل به
بیمارستان یا پزشک معالج خود
مراجعه نمایید.

بعد از 12 ساعت پس از جراحی
آپاندیسیت، شما می توانید
پاشده و حرکت کنید و بعد از 2
تا 3 هفته پس از عمل جراحی می
توانید، به زندگی عادی خود
بازگردید اگر جراحی بصورت
لایاروسکوپی انجام شود، زخم
کوچکتر و درمان سریع تر می
باشد

اگر بعد از عمل جراحی دچار
استفراغ غیرقابل کنترل، درد
زیاد در ناحیه شکمی و یا
افزایش درد ، احساس سرگیجه و
سبکی سر، خون در ادرار ، و
سرخی در زخم خود، تب و یا
عفونت در محل زخم شدید به پزشک
خود مراجعه نمایید

داروهای تجویز شده توسط پزشک

تشخیص ابتلا به آپانديسیت

آزمایش شکم برای تشخیص التهاب

آزمایش ادرار برای تشخیص
عفونت ادراری

بررسی راست روده

آزمایش خون برای بررسی عفونت
در بدن

سی تی اسکن و یا سونوگرافی

درمان آپانديسیت

درمان آپانديسیت عموماً شامل
برداشتن آپانديس ملتهب شده
می شود. سایر درمان ها بسته
به مشکل شما ممکن است، مورد
نیاز باشد. این عمل جراحی
آپاندکتومی نامیده می شود.
اگر آپانديس باعث آبسه نیز
شود، برای درمان ابتدا می
بایست آبسه را خشک و تخلیه
نمود. همچنین اگر پزشک به
آپانديسیت شدن یا نشدن شما
شک داشته باشد، بازهم برای
جلوگیری از خطرات احتمالی
ممکن است اقدام به برداشتن
آپانديس نماید. انتخاب اینکه
این جراحی بشکل لاپاروسکوپ و
یا جراحی باز انجام شود به

دلایل ابتلا به آپانديسیت

فرد زمانی دچار آپانديسیت
می شود که آپنديس وی
بوسیله مدفوع، جسم خارجی،
سرطان و یا عفونت مسدود
شود. بدون توجه به علت
مسدود شدن، زمانی که
آپانديس مسدود می شود
باکتری های درون آپانديس
شروع به تکثیر کرده و
باعث التهاب، ورم و پر از
چرک شدن آپانديس می شوند
و اگر بموقع آپانديس درمان
نشود، امکان پارگی و
ترکیدن آن وجود دارد.



آپانديس چیست؟

پانديسیت مشکلی است که در آن
آپانديس شما ملتهب شده و پر از چرک
میشود. آپانديس زائده ای کوچک و
انگشتی شکل است که از روده ی بزرگ
و درناحیه پایین و راست شکم
منشعب می شود. هرچند آپانديس هنوز
فایده شناخته شده ای ندارد، اما
می تواند باعث مشکلاتی جدی شود.

علائم آپانديس چیست؟

درد و تیرکشیدن در نواحی
ناف که اغلب به سمت راست و
پایین شکم حرکت می کند

دردی که بعد از چند ساعت
شدیدتر می شود

حساسیت و درد زمانی که شما
برروی سمت راست و پایین شکم
فشار می آورید

دردی که هنگام راه رفتن، سرفه
و یا سایر حرکات رخ می دهد

تهوع، استفراغ و کاهش
اشتها، تب، ورم شکم

و ناتوانی در اسهال، یبوست
خارج کردن بادشکم