

انسداد مجرای اشکی :

بیمار گرامی : بستری و عمل شما در بیمارستان به شرح

زیر می باشد :

ساعت ۷ صبح : حضور جهت مراحل پذیرش و بستری


تا حدود ظهر : حضور در اتاق عمل جهت جراحی

تا ساعت ۱۸ : ترخیص و پایان کار



مراقبت های قبل و بعد از عمل

سونداژ



کد : ED-PM-066-01

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۱

تاریخ بازنگری : ۱۳۹۷/۷/۱

منابع : کلیات چشم پزشکی (روگان - اسیری)
مراقبت های پرستاری و چشم (برونز و سودارث)
مورد تایید

WWW.mehreganhospital.com


وامد تبلیغات و انتشارات بیمارستان مهرگان - بخش چشم

گردآورنده : ممیده شادمان (کارشناس پرستاری)

تعرّف بیماری :

به انسداد مجرای باریکی که به طور طبیعی باعث تخلیه اشک از سطح چشم به داخل بینی می شود انسداد مجرای اشکی گفته می شود که به دو صورت اکتسابی و مادرزادی است که نوع اکتسابی آن در اثر یک عفونت رخ می دهد و در ۹۵ درصد کودکان تا قبل از یک سالگی مجرای اشکی به صورت خودبه خود باز می شود

اقدامات قبل از عمل : بیمار ۶-۷ ساعت قبل عمل ناشتا باشد. (این جراحی با بی هوشی عمومی انجام می شود)



مراقبت های پس از عمل :

۱- چشم بیمار بعد از جراحی پانسمان ندارد و مصرف قطره های چشمی که شامل قطره های ضد التهاب و آنتی بیوتیک می باشد بعد از عمل شروع می شود.

۲- شستشوی صورت بعد از عمل سونداژ بلامانع است و مراقبت از بیمار به منظور عدم ابتلا به سرماخوردگی بعد از عمل الزامی است

۳- از دستکاری چشم عمل شده خودداری شود.

۴- چشم در مقابل فشارهای خارجی محافظت شود.

نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمی :

سر خود را کمی به عقب خم کنید. پلک تحتانی را به سمت پایین بکشید. قطره را به این قسمت بچکانید (بدون تماس نوک قطره چکان با چشم یا پلک) چشم خود را به مدت ۳ دقیقه ببندید. سپس پلک بزنید. بعد از باز کردن چشم ها اشک و یا قطره جذب نشده را با دستمال تمیز از اطراف چشم خشک کنید. در صورتی که پزشک بیش از یک نوع قطره را همزمان تجویز کرده است استفاده از آن ها باید با فاصله زمانی ۳ تا ۵ دقیقه انجام شود.

